

ほけんだより

子ども健康部 幼児課
令和6年11月号外 NO.1

よぼうせつしゅ こどもの予防接種 いつ受けるの??

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) によって、世界の国々で麻しんやポリオなどのワクチン接種率が低迷し、世界的な流行が始まっています。


日本でもワクチン接種率の低下がおこり、海外から日本国内に持ち込まれたウイルスへの感染リスクが高まっています。

お子さんの予防接種について受け忘れていたワクチンがないかを改めて確認してみましょう😊

ていきせつしゅ 定期接種のワクチン 2024年4月現在

① (1) 五種混合

(DPT-IPV-Hib: 百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ・インフルエンザ菌b型混合)





(2) 四種混合 (DPT-IPV: 百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合)

三種混合 (DPT: 百日せき・ジフテリア・破傷風混合)

ポリオ (IPV: 不活化ポリオ)




② 二種混合 (DT: ジフテリア・破傷風混合)




③ インフルエンザ菌b型 (ヒブ、Hib)


初回接種の開始が生後2か月以上7か月未満の場合 (合計4回)



初回接種の開始が生後7か月以上1歳未満の場合 (合計4回)




初回接種の開始が1歳以上5歳未満の場合 (合計4回)



④ 小児肺炎球菌 (PCV15: 15価結合型、PCV13: 13価結合型)


初回接種の開始が生後2か月以上7か月未満の場合 (合計4回)



初回接種の開始が生後7か月以上1歳未満の場合 (合計3回)




初回接種の開始が1歳以上2歳未満の場合 (合計2回)



初回接種の開始が2歳以上5歳未満の場合 (合計1回)



⑤ B型肝炎 (水平感染予防)



⑥ ロタウイルス

(1) 1価ワクチンの場合

接種年齢: 生後6~24週 (1回目は生後14週6日までが望ましい)


接種間隔: 回数: 4週あけて2回

(2) 5価ワクチンの場合

接種年齢: 生後6~32週 (1回目は生後14週6日までが望ましい)

接種間隔: 回数: それぞれ4週以上あけて3回


⑦ BCG




⑧ MR (麻しん・風しん混合)、麻しん、風しん



⑨ 水痘



⑩ にほんのうえん 日本脳炎



⑪ ヒトパピローマウイルス

(1) か2価ワクチンばあいの場合



(2) か4価ワクチンばあいの場合



(3) か9価ワクチンばあいの場合

2回接種(初回接種が15歳未満の場合)



かいせっしゅ 3回接種

